

Типи В і С є найбільш небезпечними та можуть призвести до цирозу та раку печінки.


КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ?

Щонайменше раз на рік тестуйтеся на маркери вірусних гепатитів В і С. Для цього ви можете звернутися до свого **сімейного лікаря**. У разі підтвердження вірусу лікар призначить подальше лікування самостійно або скерує до лікаря, який пройшов відповідне навчання.

У жодному разі не займайтеся самодіагностикою та самолікуванням на підставі інформації з інтернету!

ГЕПАТИТ

– це запальне захворювання печінки, яке викликане вірусами різних типів, зокрема А,В,С,D,E



Усі типи вірусів спричиняють захворювання печінки, але між ними є істотна різниця

- вірусний гепатит А має виключно гостру форму, решта типів гепатитів мають як гостру, так і хронічну форму
- залежно від ступеню тяжкості та індивідуальних особливостей організму, інфекція може мати як безсимптомний перебіг, так і незначні клінічні прояви

СИМПТОМИ ГЕПАТИТІВ

- слабкість та втомлюваність
- нудота, блювання, діарея, болі в животі
- зміна кольору сечі (потемніння, сеча кольору пива) та знебарвлення калу
- пожовтіння шкіри, слизових оболонок та склер

ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ЙОГО ТИПУ

Гепатит А



Вірус передається через недостатню особисту гігієну, зокрема не миття рук, а також вживання забруднених харчів або води

Для профілактики інфікування існує безпечна, ефективна вакцина. Вживайте чисту воду та термічно оброблену їжу, помиті фрукти і овочі. Ретельно мийте руки до і під час приготування їжі та після відвідування вбиральні

Гепатит В



Передається в результаті контакту з кров'ю або іншими рідинами інфікованої людини. Може передаватися під час статевого контакту, при народженні від матері до дитини. Наразі існує лікування від ВГВ, у більшості випадків воно позитивне

Для профілактики ВГВ інфікування існує безпечна, ефективна вакцина. Використовуйте стерильні засоби для ін'єкцій, пірсингу та татуювання, та інших маніпуляцій, де відбувається порушення цілісності шкіри, а також презервативи при статевому акті

Гепатит С



Передається в результаті контакту з кров'ю або іншими рідинами інфікованої людини. Може передаватися під час статевого контакту, при народженні від матері до дитини. Наразі існує лікування від ВГС, його ефективність 95%

Використовуйте стерильні засоби для ін'єкцій, пірсингу та татуювання, та інших маніпуляцій, де відбувається порушення цілісності шкіри, а також презервативи при статевому акті. Наразі не існує вакцини від ВГС

Гепатит D



Передається в результаті контакту з кров'ю або іншими рідинами інфікованої людини. Інфікування можливе лише за наявності гепатиту В у людини або при одночасному контакту з вірусами гепатиту В і D

Вакцина від гепатиту В захищає і від гепатиту D

Гепатит Е



Передається через недостатню особисту гігієну, а також вживання забруднених харчів або води. Можливе інфікування через харчові продукти, зокрема при вживанні сирих моллюсків

Вакцини від гепатиту Е розроблені, але не є широко доступними. Вживайте чисту воду. Ретельно мийте руки до і під час приготування їжі та після відвідування вбиральні